

Après l'installation d'une obturation, d'une couronne ou d'un pont

Jour du traitement

- Prenez la médication prescrite, au besoin.
- Évitez de consommer des liquides chauds lorsque vous êtes engourdi pour ne pas vous brûler. Faites également attention de ne pas vous mordre si vous mangez alors que l'effet de l'anesthésie n'est pas dissipé.
- Évitez les aliments durs ou collants pour les premières 24h et privilégiez de mastiquer sur le côté opposé.

Du lendemain jusqu'à la guérison complète

- Se brosser les dents normalement et utiliser la soie dentaire quotidiennement.
- Il est normal de sentir un inconfort durant les premiers jours en mastiquant des aliments durs ou froids. Cet inconfort est rare, mais peut perdurer jusqu'à trois mois en autant que vous voyiez une amélioration dans le temps.
- Vous pouvez sentir que la forme ou la texture de la ou des dents ait changé et cela peut modifier la prononciation si c'est une dent du devant. Laissez-vous quelques semaines pour vous adapter à la nouvelle dent.

Quand consulter?

- Si, après une semaine, vous sentez que les dents ne ferment pas bien ensemble et que la dent réparée semble trop haute. Un ajustement est nécessaire.
- Si vous avez un appareil dentaire et que vous n'arrivez plus à l'insérer normalement suite à la réparation.
- Si la douleur au froid ou à la pression persiste plus de quelques semaines. Un ajustement pourrait être nécessaire.
- Si vous avez une douleur très intense qui vous empêche de fonctionner ou une enflure.

Si vous avez une couronne temporaire

- Passez la soie dentaire très délicatement pour éviter de décoller la couronne temporaire.

- Évitez les aliments durs ou collants dans cette région.
- Si une couronne temporaire se décolle, il vous faudra revenir pour que nous la cimentions de nouveau. Ceci a pour but d'empêcher les autres dents de bouger et de ne pas compromettre l'installation de la nouvelle dent. Si cela vous arrive la fin de semaine ou le soir, vous pouvez toutefois attendre d'obtenir un rendez-vous à la clinique dans les jours suivants pour la recoller. En attendant, vous pouvez tenter de la replacer en plaçant une petite quantité de dentifrice à l'intérieur.

En cas de douleur ou pour toute question, veuillez nous téléphoner au 418 657-3368.